



ما هو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)؟

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو سبب رئيسي لإصابة الجهاز التنفسي مما يؤثر على مجرى الهواء والرئتين، وخاصة عند الرضع والأطفال الصغار.

غالباً ما يسبب RSV أعراضاً شبيهة بالبرد وهو السبب الأكثر شيوعاً لعدوى الصدر التي تسمى التهاب الشعب الرئوية. غالباً ما يعاني الرضع والأطفال الصغار من توعك خفيف من الـ RSV ويتعافون بسرعة. قد يصاب بعض الرضع والأطفال الصغار بعدوى شديدة تؤدي إلى دخول المستشفى وتهدد الحياة.

ينتشر RSV بسهولة من شخص لآخر ويكون أكثر نشاطاً من أواخر الخريف إلى أوائل الربيع. يمكن أن تصاب أنت وطفلك بفيروس RSV من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب بفيروس RSV أو سطح ملوث. يمكنك أيضاً أن تصاب به من خلال التواجد في نفس المكان مع شخص مصاب بفيروس RSV يسعل أو يعطس.

ما الذي يمكنني فعله لحماية طفلي من RSV؟

هناك طرق آمنة وفعالة لمنع طفلك من الإصابة بعدوى RSV. وتشمل هذه:

دواء وقائي للأجسام المضادة يُعطى للطفل ✓

لقاح يُعطى للحامل ✓

هناك حاجة إلى واحد فقط من هذين الخيارين للمساعدة في حماية الطفل من RSV. ليست هناك حاجة لاستخدام كل من الدواء الوقائي للأجسام المضادة واللقاح ما لم يوصي به مقدم الرعاية الصحية.

توصي اللجنة الاستشارية الوطنية الكندية للتحصين (NACI) بإعطاء دواء وقائي للأجسام المضادة للطفل كشكل مفضل للحماية من عدوى RSV على اللقاح الذي يتم إعطاؤه للحامل. تستند هذه التوصية إلى مدى جودة عمل الدواء الوقائي للأجسام المضادة، ومدة توفير الحماية ومدى أمانه.

ما هي أعراض RSV؟

تشابه أعراض RSV مع أعراض البرد أو الأنفلونزا. وذلك يشمل:



الحمى



رشح الأنف



السعال



الأزيز في الرئتين



انخفاض الطاقة أو التعب بشكل غير عادي



شرب أو تناول كميات أقل



سرعة الانفعال

Beyfortus™ "بيفورتوس" (المعروف أيضاً باسم **nirsevimab** "نيرسيشيماب") هو الدواء الوقائي للأجسام المضادة الموصى به.

إنه ليس لقاح. يعمل Beyfortus من خلال التصرف مثل الأجسام المضادة التي تصنعها أجسامنا للمساعدة في التخلص من الجراثيم والمواد الضارة.

اطلب العناية الطبية على الفور إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس، و/أو يعاني من الجفاف، و/أو تزداد أعراضه سوءاً. !

هل بيפורتوس آمن؟



أظهرت التجارب السريرية أن **Beyfortus آمن للرضع والأطفال الصغار**. كما ثبت أن Beyfortus يمنع الأمراض المرتبطة بفيروس RSV مثل التهاب الشعب الرئوية عند الأطفال ويمنع عدوى RSV الشديدة التي تتطلب دخول المستشفى.

الآثار الجانبية بعد تلقي Beyfortus عادة ما تكون خفيفة وتستمر بضعة أيام فقط. تشمل الآثار الجانبية الشائعة الاحمرار والتورم والألم في موقع الحقن والطفح الجلدي و/أو الحمى.

يمكن إعطاء Beyfortus بأمان في نفس اليوم أو في نفس الأسبوع مثل التطعيمات الأخرى الموصى بها بشكل روتيني للأطفال.

الحصول على Beyfortus لن يصيب الطفل بـ RSV. لا يزال من الممكن أن يصاب الطفل بمرض شديد من RSV حتى لو تلقى Beyfortus ولكن ذلك نادر حدوثه.

هل طفلي مؤهل للحصول على بيפורتوس؟



طفلك مؤهل لتلقي Beyfortus خلال موسم RSV (أواخر الخريف إلى أوائل الربيع) في أونتاريو إذا كان:

- ✓ وُلد في عام 2024 قبل موسم RSV
- ✓ وُلد خلال موسم RSV لعام 2024/25
- ✓ حتى عمر عامين وعرضة للإصابة بمرض RSV الشديد خلال موسم RSV التالي*

* وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر الأطفال الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة الخداجية (خلل التنسج القصي الرئوي)، وأمراض القلب الخلقية، ونقص المناعة الشديد، ومتلازمة داون، والتليف الكيسي، والأمراض العصبية العضلية، وتشوهات مجرى الهواء الخلقية.

عادة ما يكون موسم RSV من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان، لكنه يتغير كل عام ويمكن أن يعتمد على مكان وجودك في أونتاريو.

أين يمكن لطفلي الحصول على بيפורتوس؟



يوصى بإعطاء Beyfortus في المستشفى قبل خروج طفلك إلى المنزل بعد الولادة. يمكن أيضاً إعطاء Beyfortus لطفلك من قبل مقدم الرعاية الأولية الخاص بك أو من خلال وحدة الصحة العامة المحلية. بالنسبة للأطفال الصغار المؤهلين، قد يتم إعطاء Beyfortus في مكتب طبيب الأطفال أو مقدم الرعاية الأولية، وكذلك من خلال العيادات الخارجية للمستشفى.

متى يمكن لطفلي الحصول على بيפורتوس؟



إذا وُلد طفلك خلال موسم RSV، فمن المستحسن أن يُعطى Beyfortus بعد الولادة مباشرة لتوفير الحماية خلال الأشهر الأولى عندما يكون طفلك أكثر عرضة للخطر. إذا ولد طفلك في عام 2024 قبل موسم RSV أو كان معرضاً بشكل مستمر لخطر كبير من عدوى RSV حتى موسمه الثاني من RSV، فمن المستحسن إعطاء Beyfortus قبل وقت قصير من بدء موسم RSV.

كيف يتم إعطاء بيפורتوس لطفلي؟



يتم إعطاء Beyfortus كحقنة لمرة واحدة (غالباً في عضلة الفخذ) لطفلك من قبل مقدم الرعاية الصحية. يوفر الدواء الحماية والحصانة ضد RSV بمجرد تلقيه ويعمل بشكل أفضل خلال **الأشهر الستة الأولى** بعد إعطائه.

ما هي الطرق الأخرى التي يمكنني من خلالها حماية طفلي وعائلتي من RSV؟



تنظيف وتطهير الأسطح بانتظام



غسل اليدين كثيراً



البقاء في المنزل عند المرض وتجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مرضى



تجنب التدخين بالقرب من الطفل



إرضاع الطفل (توجد أجسام مضادة واقية في حليب الصدر)



السعال أو العطس في الذراع

Abryso™ "ابريسفو" (المعروف أيضاً باسم RSVpreF) هو لقاح يمكن إعطاؤه للحامل لمنع عدوى RSV عن الطفل.

- ✓ يتم إعطاؤه بين **32 و 36 أسبوعاً من الحمل** إذا كان تاريخ ولادة الطفل بالقرب من بداية أو أثناء موسم RSV.
- ✓ يساعد Abryso الجهاز المناعي للحامل على إنشاء أجسام مضادة يمكن أن تنتقل إلى الطفل أثناء الحمل. ستحمي هذه الأجسام **المضادة للطفل من عدوى RSV حتى يبلغ من العمر ستة أشهر**.

يمكن التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بكم أو وحدة الصحة العامة المحلية للحصول على مزيد من المعلومات إذا كنتم تفكرون في هذا اللقاح.



صحيفة الوقائع هذه هي للحصول على معلومات عامة فقط ولا تحل محل المشورة الطبية أو التشخيص أو العلاج. يمكنكم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية لمناقشة خياراتكم واتخاذ قرار بشأن خطة لحماية طفلكم خلال موسم RSV الذي يناسبكم أنتم وعائلتكم.



قوموا بزيارة موقع RSV التابع لوزارة الصحة في أونتاريو لمزيد من المعلومات: